
Informe RING RLN

Junio 26

La Red de Información Nacional Ganadera (RING), tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables de importancia, en el desempeño de las empresas ganaderas.

I) Altura de Forraje en Campo natural y Estado de las pasturas sembradas.



La disponibilidad de pasto, continúa siendo buena para la época, manteniéndose practicamente sin cambios en los últimos 30 días.

Casi el 70 **%** de los sistemas ganaderos, muestran una altura promedio mayor a 5 cm. Si bien no se perciben diferencias importantes respecto al promedio regional, tanto Artigas como Río Negro, muestran “algo mas de pasto”.

En cuanto a la **calidad**, mayoritariamente se considera como” buena ”ó “moderada” No obstante,esto representa un a leve caída respecto al mes anterior.. Las heladas comienzan a hacer “ lo suyo”..

Casi la mitad de los productores (47%), manifiesta contar con **praderas permanentes**; su estado actual se cataloga como “bueno” por casi 7 de cada 10. Paysandú y Río Negro, cuentan con un porcentaje de predios con praderas mayor al promedio señalado inicialmente

Los Mejoramientos Extensivos, están presentes en el 43% de los predios. La mitad considera su estado como “bueno” y la otra mitad entiende que el mismo es “regular”. En Artigas, sin embargo, el 80% entiende que su estado es “bueno” ó “muy bueno”.


En el caso de “los nuevos”, cuesta ver plantas, seguramente debido a la competencia del tapiz y a las condiciones registradas de “poca agua y frío”, ocurridas al final del presente otoño.

El 40% de los productores sembró **verdeos de invierno y** su estado se considera mayoritariamente como “bueno “. Hay un número significativo que considera que su estado es “regular” (40%).

A escala regional, Salto es el departamento con menor porcentaje de predios con verdeo (27%) y Paysandú tiene el mayor (55%).

En resumen, comienza el invierno con una buena disponibilidad de forraje en los sistemas ganaderos de la región. La misma se basa en el buen estado de los tapices naturales y en un buen aporte de praderas y verdeos, en aquellos casos en que se cuenta con dichos recursos.

II) Estado corporal de las vacas de cría en RLN



Los rodeos están en buena condición corporal en términos generales.

Como se observa, **casi el 75 % de los** rodeos presentan un estado corporal **mayor a 4**. Hay un número significativo de sistemas con CC mayor a 4,5 (27%).

Con una mirada departamental, en Artigas 8 de 10 predios cuentan con CC superior a 4 y en 3 de 10 se ubica por encima de 4,5.

Salto, Paysandú y Río Negro, se ubican muy cerca del promedio mostrado en la figura.

A partir de estos resultados, se recomienda continuar prestando atención a los rodeos que se encuentren en el límite inferior para la época (4), intentando lograr que no pierdan peso a lo largo del invierno.

Por otro lado, aquellos ganados de cría que se encuentren entre 3,5 y 4 de CC, deberían buscar la forma de recuperar esa CC. La asignación de potreros adecuados en calidad y volumen de pasto y/o la suplementación proteinada, puede ser herramientas válidas en esas situaciones.

En síntesis, sumado a la situación forrajera presentada anteriormente, se puede afirmar que se comienza a transitar el invierno, en un escenario de cierta tranquilidad en relación al desempeño productivo de los sistemas ganaderos de la región.

III) Dotación

El 64% tiene una dotación **menor a 0,81 UG/ha,** si se consideran los 4 departamentos**. S**in embargo, en Artigas esa cifra aumenta al 73% y en Paysandú cae al 60% de los casos.

La dotación promedio general en la Regional es de 0,86UG/ha.

Mayoritariamente se considera que la misma está ajustada a la oferta actual de forraje en los predios.

IV) Diagnóstico de Gestación

Entre quienes realizaron Diagnóstico de gestación **durante abril y mayo** (50% de quienes respondieron la RING), los resultados muestran que considerando **TODO el rodeo**, el índice de preñez alcanzado fue **de 77%.** A escala departamental en Salto se ubicó en 82%, siendo el valor más alto dentro de la Regional.

Considerando las diferentes categorías dentro del rodeo, las vacas de 2do entore alcanzaron un menor nivel de preñez, alcanzando un 66%.

Cabe señalar que el 40% de los sistemas presentan niveles de preñez superiores **a 80%.**

V) Recría e Invernada.

6 de cada 10 productores actualmente está suplementando las recrías ó tiene decidido hacerlo durante los meses de invierno.

Este % es menor en Artigas (46) y muy similar en Salto y Paysandú (en el entorno de 60%)

Entre aquellos que monitorean la evolución de peso, la mayoría reportan ganancias diarias de entre 200 y 400 gramos.

En el caso de las **invernadas,** se ubican mayoritariamente por encima de los 600gramos/día en Paysandú y en el rango de entre 200-400 en Artigas.

VI) Ovinos

El 77% reporta tener lanares si se consideran las respuestas de los 4 departamentos. Sin embargo, en Artigas y Salto, este valor supera el 90%.

8 de cada 10 consideran que su estado es “bueno” y el resto que es “regular”. No se observan diferencias significativas entre departamentos.

VII) Bichera y Garrapata.

El **76%** de los productores reporta la existencia de “bichera” en sus establecimientos.

Su incidencia actual se califica mayoritariamente como “baja” ó “moderada”.

Garrapata

Entre quienes “tienen garrapata”, el 37 % “actualmente ha observado presencia en los animales”.
Artigas y Salto, es donde se reportan mayor cantidad de predios en esa situación.
El85% de ellos, está realizando algún tipo de tratamiento contra el ectoparásito.

La afectación por “tristeza” alcanzó a un 37% de los predios y en un 25% se reporta muerte de animales por esa causa. En Artigas, es donde se registró la mayor cantidad de predios con muerte de animales.

VII) Agua y Sombra.

El 93% de los productores responde que la disponibilidad actual de agua es “buena” ó “muy buena”.

Respecto al acceso a sombra, la situación es muy similar, más del 70% cuenta con sombra “buena” ó “muy buena”.